



ประกาศคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 นั้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์จึงขอประกาศให้ดำเนินการดังต่อไปนี้


1. บุคลากร นิสิต นักเรียน ที่มีอาการ หรือมีความเสี่ยงสูงหรือมีประวัติที่เข้าได้กับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยทันที ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือศูนย์การแพทย์ปัญญาննทกิก兮 ชลประทาน หรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานพร้อมทั้งแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชารับทราบโดย

- 1.1 บุคลากรที่ป่วยให้รายงานต่อ คณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
- 1.2 นิสิตที่ป่วยให้แจ้งต่อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
- 1.3 อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธาง្មร)

คณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์



## ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทรงหนักถึงอันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร นิสิต นักเรียน ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังนี้

ข้อ 1. บุคลากร นิสิต นักเรียน ที่มีอาการ หรือมีความเสี่ยงสูงหรือมีประวัติที่เข้าได้กับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยในทันทีที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือศูนย์การแพทย์ปัญญาอันทวิกุล ชลประทาน หรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชา.rับทราบ โดย

- 1.1 บุคลากรที่ป่วยให้แจ้งต่อ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล (หรือผู้ได้รับมอบหมายด้านบุคลากร)
- 1.2 นิสิตที่ป่วยให้แจ้งต่อ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (หรือรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่กำกับดูแลนิสิต)
- 1.3 นักเรียนที่ป่วย ให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลนักเรียน)

ข้อ 2. บุคลากร นิสิต นักเรียน ที่มีอาการ หรือมีความเสี่ยงสูงหรือมีประวัติที่เข้าได้กับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อ 1. เมื่อได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่สถานพยาบาลมาตรฐานแล้ว หากพบว่า มีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือศูนย์การแพทย์ปัญญาอันทวิกุล ชลประทาน หรือสถานพยาบาลอื่นๆที่มีมาตรฐาน โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้บุคลากร นิสิต หรือนักเรียนนั้นลาป่วย และจะสามารถกลับมาปฏิบัติงาน หรือกลับมาศึกษาต่อได้หลังจากที่ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว พร้อมมีใบรับรองแพทย์ยืนยันให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานหรือศึกษาต่อได้โดยไม่แพร่กระจายโรคให้แก่ผู้อื่น

ข้อ 3. บุคลากร นิสิต นักเรียน ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีประวัติเดินทางไปยังกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 14 วันหรือสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าติดเชื้อจริง แต่ยังไม่มีอาการใดๆ ให้บุคลากร นิสิต นักเรียนนั้นปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- 3.1 แจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชา.rับทราบในทันที โดย
  - ก. บุคลากรให้แจ้งต่อ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล (หรือผู้ได้รับมอบหมายด้านบุคลากร)

ข. นิสิตให้แจ้งต่อ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (หรือรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่กำกับดูแลนิสิต)

ค. นักเรียนให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลนักเรียน)

3.2 ให้บุคลากร นิสิต นักเรียนนั้นทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน งดการรวมกลุ่มกับผู้อื่น ไม่เข้ามาภายในพื้นที่ชุมชนของมหาวิทยาลัย และไม่เดินทางออกจากบ้านหรือที่พักโดยไม่จำเป็น จนกว่าจะพ้นช่วงระยะเวลา กักตัว และไม่อนุญาตให้กักตัวในหอพักของมหาวิทยาลัยที่มีผู้พักอาศัยอยู่ร่วมในห้องเดียวกัน (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบเรื่อง “คำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at home) ”)

3.3 ต้องทำการวัดไข้ตอนเช้าทุกวัน โดยต้องรายงานตนและการเปลี่ยนแปลงของอาการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับทราบทุกวัน โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเขียนรายงานการเปลี่ยนแปลงรายวันเสนอต่อประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3.4 หากในระหว่างกักตัว มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หอบ เหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบพบแพทย์ ในทันที พร้อมแจ้งต่ออาจารย์ที่รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 3.1 และให้ผู้บังคับบัญชารายงานตรงต่อประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินฯ โควิด-19 โดยทันที

3.5 หากผลการตรวจ Throat swab ให้ผลเป็นบวกหรือพบเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ปฏิบัติตั้งแต่

3.5.1 บุคลากร นิสิต นักเรียนนั้นต้องเข้ารับการดูแลรักษาต่อเนื่องที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือศูนย์การแพทย์ปัญญาบ้านทวีกุ๊ช ชลประทาน หรือสถานพยาบาลมาตรฐานอื่นๆ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยแพทย์อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือให้กลับไปกักตัวต่อเนื่องที่บ้านหรือที่พัก ต่อไป หากกลับไปกักตัวต่อเนื่องที่บ้านหรือที่พัก ให้บุคลากร นิสิตหรือนักเรียนนั้นปฏิบัติตามข้อ 3 ต่อไปอย่างเคร่งครัด

3.5.2 บุคลากร นิสิต นักเรียนนั้นต้องรายงานผลการตรวจต่อผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ ตามที่ได้รับมอบหมายข้างต้น โดยทันที

3.5.3 ให้ผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ซักประวัติการเดินทางในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาของบุคลากร นิสิต นักเรียนที่ติดเชื้อรายนั้นฯ โดยละเอียดและแจ้งต่อประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินฯ โควิด-19 และดำเนินการแจ้งต่อบุคลากร นิสิต นักเรียนทั้งหมดที่ได้สัมผัสกับบุคลากร นิสิต นักเรียนที่ติดเชื้อรายนั้นฯ เพื่อให้ทุกๆ คนที่สัมผัสเข้าสู่กระบวนการกักตัว เป็นเวลา 14 วันตามข้อ 3 นี้เข่นเดียวกัน

3.6 หากผลการตรวจ Throat swab ให้ผลเป็นลบหรือไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19 ให้บุคลากร นิสิต นักเรียนนั้นทำการกักตัวตามข้อ 3.2-3.4 ต่อไปจนครบ 14 วัน เมื่อครบกำหนด 14 วัน แล้วหากไม่มีอาการใดๆ ให้บุคลากร นิสิต นักเรียนนั้นมารายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อกลับมาปฏิบัติงานหรือศึกษาต่อตามปกติต่อไป

ข้อ 4. บุคลากร นิสิต นักเรียน ที่มีความเสี่ยงต่อ และมีอาการของไข้หวัด เช่น ไข้ต่ำๆ ไอ น้ำมูก โดยไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากร นิสิต นักเรียน เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือศูนย์การแพทย์ปัญญาบันทกิจฯ ชลประทาน หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่มีมาตรฐาน ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เมื่อยุ่งในพื้นที่สาธารณะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสระบเวณใบหน้าและจมูก

ข้อ 5. ในระหว่างที่มีการกักตัวของนิสิต หรือนักเรียน อาจารย์ที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาจัดการเรียน การสอนผ่านทางระบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นๆ แทนการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ ให้แก่ นิสิต หรือนักเรียน อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอน ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ได้แก่ คณบดี โดยให้ผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพิจารณาด้วยหลักความปลอดภัยของผู้เรียนและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคเป็นสำคัญ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วย

5.1 จัดที่นั่งเรียนหรือที่นั่งสอบของแต่ละคนให้ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร

5.2 ผู้เรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

5.3 จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลกระจายตามจุดต่างๆ ของสถานที่เรียนอย่างเพียงพอ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและผู้สอนทุกคนทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอีกอย่างสม่ำเสมอ

5.4 งดการสัมผัสด้วยระหว่างกันในหมู่ผู้เรียน

5.5 จัดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียนและทุกพื้นผิวด้วยน้ำยาทำความสะอาดตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไว้ (เอกสารแนบ) ทั้งก่อนและหลังจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

ข้อ 6. ในกรณีที่พบบุคลากร นิสิต นักเรียนที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตรงต่อประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินฯ โควิด-19 และให้พิจารณาปิดอาคารและพื้นที่ของหน่วยงาน/ คณะที่ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้สัมผัส เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน เพื่อทำความสะอาดตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไว้ (เอกสารแนบ)

ข้อ 7. การไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาตามประกาศนี้ เป็นความผิดวินัยหรือวินัยร้ายแรง เลวuent กรรม รวมทั้งความรับผิดอื่นทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## **ข้อมูลแบบท้ายประกาศ**

**เรื่อง มาตรการการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19**

**นิยามผู้ที่มีสัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง (High risk contact)**

หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. ผู้ที่เรียนหรือทำงานร่วมห้อง, ผู้ที่นอนร่วมห้องหรือ เพื่อนสนิทที่คุยกัน หรือ
2. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จาม รถจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกันใดๆ เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากที่ไม่สามารถกันน้ำได้
3. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วยและอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน

**นิยามผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact)**

หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง

นิยามผู้ไม่ได้สัมผัส

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย/คณะเดียวกันแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนป่วย

เอกสารอ้างอิง <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines>

**แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (27 กุมภาพันธ์ 2563)**

**1. สารทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ**

เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ เป็นเวลา 1 - 3 วัน พื้นผิวที่อาจสัมผัสบ่นเป็นเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ดังนี้

- 1) น้ำยาฟอกขาวสามารถใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวได้ โดยผสมในอัตราส่วนดังนี้
  - a. พื้นผิวทั่วไป ใช้น้ำยาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ำ 99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% หรือเท่ากับ 500 ppm)
  - b. พื้นผิวที่มีน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ สารคัดหลังของผู้ป่วย เช่น ห้องสุขา โถส้วม ใช้น้ำยาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ำ 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทึบไว้อย่างน้อย 15 นาที
- 2) สำหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้ 70% แอลกอฮอล์ทำความสะอาดได้
- 3) สิ่งแวดล้อมที่เป็นสัดผ้า ที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ควรทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น้ำที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอกในครัวเรือนได้

**2. แนวทางการทำความสะอาดสำหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อ COVID-19 ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล**

- 1) ควรปิดกันบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อก่อนดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อบังกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับเชื้อ
- 2) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะทำความสะอาดพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อ ระหว่างทำความสะอาด หากถุงมือชำรุดเสียหายมีรอยร้าว ให้ถอดถุงมือออก และสวมถุงมือคู่ใหม่ทันที ควรกำจัดและทิ้ง PPE แบบใช้แล้วทิ้งจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น ในกรณีที่ใช้แว่นตา Goggles ควรทำการฆ่าเชื้อหลังการใช้แต่ละครั้ง และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำทันทีหลังจากถอด PPE
- 3) เลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีด้ามจับ เพื่อสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวให้น้อยที่สุด
- 4) เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อการระบายอากาศ เมื่อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว
- 5) ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาวที่เตรียมไว้
- 6) เช็ดทำความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น บุ้งกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, พนักพิงที่นั่ง, โต๊ะ, ริมบท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ, ฯลฯ ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

คำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)  
สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (23 กุมภาพันธ์ 2563)

1. การเตรียมความพร้อมก่อนนักเรียน/นักศึกษาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

1.1 ติดตามรายชื่อประเทศที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องในชุมชน จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1.2 เลือกที่พักอาศัยสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

- ให้แยกห้องนอนและห้องน้ำของนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด โดยไม่ปะปนกับสมาชิกคนอื่นในบ้าน
- มีอากาศถ่ายเทดี
- มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา และสมาชิกที่อาศัยร่วมบ้าน เช่น หน้ากากอนามัย สนู๊ฟ เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือ
- อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวกด้วยพาหนะส่วนบุคคลหรือพาหนะของสถานศึกษา

1.3 กำหนดผู้ประสานงานของสถานศึกษาในการติดต่อกับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา และประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

1.4 เตรียมความพร้อมเรื่องหลักสูตรการเรียนพิเศษจากที่บ้าน เช่น online course สำหรับนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มนี้

2. การคัดกรองผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ณ สนามบินนานาชาติ

- นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ ใน การคัดกรองไข้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
- หากมีอาการไข้ หรือ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทราบทันที
- กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายได้  $> 37.5^{\circ}\text{C}$  จะถูกแยกตัวมาตรวจ หากยังมีไข้ จะส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจ วินิจฉัยและรักษาตามระบบ

3. กำรปฏิบัติตัวระหว่างการแยกสังเกตอาการที่บ้าน/ที่พัก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

- ให้หยุดการเข้าเรียน และงดเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีการรวมคนจำนวนมาก
- นักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมา ควรนอนแยกห้อง ไม่อยู่กับครอบครัว ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดมาถึงประเทศไทย
- รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น อาจรับประทานอาหารร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง

- ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ ร่วมกับผู้อื่น
- ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ถูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นอย่างน้อย 60%
- สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตร
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ
- การทึ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ใช้วิธีพับ ม้วน ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที
- ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูครั้งที่ออกจาก โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อออกจาก และ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทันที
- ทำความสะอาดบริเวณที่พักของนักเรียน/นักศึกษา เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย รวมถึงห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โดยเดี่ยมไฮโดรคลอโรไรท์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน)
- ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมชาติและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 °C

#### 4. วิธีการสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีอาการป่วย

- ที่หอพักนักเรียน/นักศึกษา ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิตัวโดย Handheld thermometer บริเวณหน้าหอพัก ในจุดที่นักเรียน/นักศึกษาทุกคนที่เดินทางกลับมา ต้องเดินผ่านเข้าออก
- สังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีมีประวัติไข้แนะนำให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน ช่วงเช้าและเย็น

##### 1) อาการไข้ได้แก่

- วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ
- มีอาการสงสัยว่ามีไข้ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น

2) อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้ประสานงานของสถานศึกษา พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ขณะเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้เสมอ

#### 5. การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยร่วมบ้าน และวิธีการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมในบ้าน

- ทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้ง เพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ โดยใช้น้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ถูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
- ผู้ระหว่างการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกคนอื่นในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน หลังสัมผัสกับผู้ป่วย

- นอนแยกห้องกับนักเรียน/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด
- อาจรับประทานอาหารร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
- ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้เดินทางกลับ
- หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดในระยะ 1-2 เมตรกับนักเรียน/นักศึกษาที่กลับมาจากพื้นที่ระบาด
- ทำความสะอาดบริเวณที่พักของนักเรียน/นักศึกษา เช่น เตียง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย รวมถึงห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน)
- ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมชาติและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิน้ำ 60-90 °C
- หากมีแม่บ้านทำความสะอาดห้องพักของนักศึกษา/นักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาด แนะนำให้ใส่ชุดป้องกันร่างกาย ได้แก่ หน้ากากอนามัย หมากคลุมผ嘴 แว่นตา กันลม ถุงมือยาง รองเท้าบูท และผ้ากันเปื้อนพลาสติก